

# LÖK- Was kommt noch?



- Besatzdichte Volieren:

Uneinigkeit unter den Verbänden

Naturland: 12 pro m<sup>2</sup> Warmbereich, 10,5 pro m<sup>2</sup> Gesamtstall

-Besatzdichte Junghennen

-Auslauf Mastgeflügel im Winter

Konsequenzen für die Naturland-Richtlinien:

Nur bei den Junghennen (Nicht-Anrechenbarkeit und Größe des überdachter Vorplatzes)

## Auslaufgestaltung bei Legehennen

Die im letzten Jahr vorgestellte Diskussion zur Auslaufgestaltung hat uns von den Kontrollbehörden eingeholt.

- Im Auslauf nicht nur Schutz, sondern auch Wind beachten.
- Zusätzlich einjährige Kulturen wie Waldstaudenroggen oder Topinambur?
- Obstbäume gut, aber brauchen relativ lange
- Entfernung der Elemente voneinander

Stallnaher Bereich:

- Folie unter die oberste Bodenschicht, um N-Versickerung zu vermeiden. (N-Messungen geplant)
- Schotter oder Rasensteine wegen Hygiene.
- Holzhäcksel/Sand als wieder entfernbares Material

# Auslaufgestaltung bei Legehennen



# Auslaufgestaltung bei Legehennen



# Auslaufgestaltung bei Legehennen



# Auslaufgestaltung bei Legehennen



# Qualitätssicherung Futter



**Dioxinskandal 2010**

**Betrifft überwiegend Futtermühlen**

**Es sind nicht ausreichend Naturland-Rohstoffe verfügbar.**

**Prioritätenliste der Zukäufe.**

**Besuche bei den Lieferanten.**

# Befiederung



Berichte über schlecht befiederte Legehennen.

Maßnahmen:

- Beschäftigung: Einstreu, Auslauf
- Futter: Bei niedrigem Energiegehalt müssen Hühner länger fressen
- Junghennenaufzucht
- Rassewahl: H+N Silver Nick und Amberlink sind besser.

Verhandlung mit einem Naturkostgroßhändler wegen Listung von Zweinutzungshühner Les Bleues.